

Trigloporus lastoviza

Esta espécie de ruivo é muito comum no infratidal misto e arenoso, sobretudo nas imediações de estuários, podendo ser muito abundante. A sua morfologia é única da família de peixes em que se inclui, os triglídeos, apresentando uma cabeça de grande dimensão de aspeto robusto e repleta de espinhos com olhos de grande dimensão e boca infra-terminal num prolongamento da cabeça. Os três primeiros espinhos das barbatanas peitorais encontram-se modificados e altamente especializados permitindo aos indivíduos deslocarem-se por reptação no leito marinho e cada barbatana peitoral é formada por dois lobos sobrepostos. O lobo inferior da barbatana peitoral apresenta um padrão azul iridescente. O padrão de coloração do corpo é variável e a espécie distingue-se de *Chelidonichthys lucerna* pelo perfil da cabeça que em *T. lastoviza* apresenta um ângulo mais fechado. Esta espécie tem interesse comercial sendo capturada em redes de tresmalho de fundo e arrasto.

Estatuto de ameaça - Não avaliada.

Distribuição na área de estudo - Entre a Comporta e o Burgau, sendo mais abundante nas áreas adjacentes aos estuários dos rios Sado e Mira.

Distribuição Global - Atlântico Este desde a Noruega até ao Índico Sudoeste em Moçambique. É uma espécie muito abundante no mar Mediterrânico.